

## Pour Commencer :




1. Expliquer à la mère la raison du test et obtenir son consentement.



2. Il faut : des gants sans poudre, des tampons d'alcool, des compresses stériles, une boîte pour les objets tranchants et le papier buvard pour le test. Ne pas toucher les cercles sur le papier buvard.



3. Se laver les mains. Mettre les gants. Si vos gants ont de la poudre, lavez les gants avant de toucher à la carte. La poudre des gants peut modifier le résultat du test.



4. Incrire sur le papier buvard le code du patient, la date de naissance et la date à laquelle l'échantillon a été prélevé.

## La Pique au Talon (Naissance à 5 Mois) :



1. Piquer le talon dans la région indiquée dans le diagramme. Quand vous piquez, évitez le milieu du talon.



2. Nettoyez le talon à l'aide de la compresse d'alcool. Quand le talon est tout à fait sec, piquez avec la lancette. Nettoyez la première goutte de sang avec la gaze. Mettez la lancette et la gaze utilisées dans la boîte pour objets tranchants. Pressez fermement le talon et laissez couler les gouttes de sang sur les cercles du papier buvard.



3. Remplissez chaque cercle complètement avec le sang. Relâchez votre pression pour que le sang circule dans le pied puis pressez de nouveau pour obtenir plus de sang. Il se peut que vous deviez piquer plusieurs fois. Utilisez une nouvelle lancette pour chaque pique. Lorsque le papier buvard est rempli, arrêtez le saignement avec du coton ou de la gaze.




4. La carte à gauche n'est pas totalement remplie et le test ne sera pas réussi. La carte à droite est correctement remplie et le test sera réussi. Voyez « Pour Terminer ».

## La Pique à L'orteil (5 à 10 Mois) :



1. Les endroits marqués avec des flèches sont des endroits sûrs à piquer. Éviter le bout de l'orteil ou la partie épaisse sous le pied.



2. Nettoyer l'orteil avec de l'alcool. Lorsque l'orteil est complètement sec, piquer avec la lancette. Nettoyez les premières gouttes de sang avec la gaze. Mettez la lancette et la gaze utilisées dans la boîte à objets tranchants. Pressez fermement le pied et laissez couler les gouttes de sang dans les cercles du papier buvard.



3. Remplissez les cercles du papier buvard. Piquez de nouveau si c'est nécessaire. Lorsque tous les cercles du papier buvard sont remplis de sang, arrêtez le saignement avec du coton ou de la gaze. Voyez « Pour Terminer ».

## Pique au Doigt (Après 10 Mois) :



1. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire sont les plus utilisés. Les endroits marqués par des flèches sont les plus sûrs à piquer. Evitez de piquer le bout du doigt ou sous le doigt.



2. Nettoyez le doigt avec de l'alcool. Lorsque le doigt est complètement sec, piquez avec la lancette. Nettoyez les premières gouttes de sang avec la gaze. Mettez la lancette et la gaze utilisées dans la boîte à objets tranchants. Pressez fermement la main et laissez couler les gouttes de sang dans les cercles du papier buvard.



3. Remplissez les cercles du papier buvard. Piquez de nouveau si c'est nécessaire. Lorsque tous les cercles du papier buvard sont remplis de sang, arrêtez le saignement avec du coton ou de la gaze. Voyez « Pour Terminer ».

## Pour Terminer :



1. Laissez sécher les cartes dans un endroit ombragé et sec, à l'abri des insectes et de la poussière pendant au moins 4 heures. On peut laisser sécher une nuit ou plusieurs jours dans un endroit sec et protégé.



2. Mettez chaque carte séchée dans un sac en plastique avec 1 dessiccatif dans le sac. Envoyez au laboratoire.