

Diagnostic Précoce du VIH chez L'enfant- HAÏTI

Le Protocole pour un test PCR **Négatif**

Une femme enceinte et séropositive

*Conseils Alimentaires le plus tôt possible
et counseling pre-test PCR*

Un test PCR pour nourrisson de 4-6 semaines jusqu'à 12 mois
(Commencez Co-trimoxazole)

Test PCR = **NEGATIF**

L'allaitement
maternel exclusif

Doutes du choix
alimentaire

L'allaitement
artificiel exclusif

Re-testez l'enfant à
18 mois avec un test
rapide

6 semaines après que la mère ait arrêté
l'allaitement maternel complètement,
il faut refaire un test. Si l'enfant a moins de 18 mois,
utilisez un test PCR. Si l'enfant a plus de 18 mois,
utilisez un test rapide

Test PCR/Rapide=NEGATIF

L'enfant est VIH NEGATIF

Continuez à suivre l'enfant
jusqu'à l'âge de 2 ans.
L'enfant est toujours susceptible
aux autres maladies.
Arrêtez Co-trimoxazole

Test PCR= POSITIF

Counseling post-test PCR Positif et preparation pour l'initiation ARV

Refaites tout de suite
un autre PCR
(Continuez Co-trimoxazole et placez
l'enfant sous ARV)

POSITIF

l'enfant est infecté au VIH
à cause de la transmission par le
lait maternel

Continuez ARV et
Co-trimoxazole

Continuez à suivre l'enfant

Test Rapide= POSITIF

L'enfant est
infecté au VIH
(Commencez ARV
et continuez
Co-trimoxazole)